

MA PAK LEUNG BAT PO KENG FOONG POWDER 29-10-1-AA07



Boite de 10 doses de 0,26g de poudre.

<i>Arisaema cum bile</i>	39,0mg	<i>Succinum</i>	18,2mg
<i>Saposhnikovia divaricata (Turez) Schischk</i>	39,0mg	<i>Borneolum syntheticum</i>	14,3mg
<i>Glycyrrhiza uralensis Fish</i>	39,0mg	<i>Margarita</i>	7,0mg
<i>Uncaria rhynchophylla (Miq) Jacks</i>	39,0mg	<i>Moschus moschiferus Linnaeus</i>	1,3mg
<i>Cryptotympana pustulata Fabricius</i>	20,8mg	<i>Calculus Bovis</i>	0,8mg
<i>Buthus martensii Karsh</i>	20,8mg	<i>Composition pour 1 dose.</i>	
<i>Bombyx mori L.</i>	20,8mg		

Indication(s) :

Insomnie, Irritabilité.
Refroidissement, toux productives.

Voie d'administration :

Voie orale.

Posologie :

Réservé à l'Adulte : 1 dose 3 fois par jour à diluer dans de l'eau tiède.

Précaution(s) d'Emploi :

Ne pas consommer d'aliment cru, froid et huileux pendant le traitement.
Pas d'utilisation prolongée : contient notamment de l'acide glycyrrhizinique.

Contre-indication(s) :

Ne pas donner à la femme enceinte ou allaitante.
Ne pas donner à l'enfant de moins de 15 ans.
Ne pas utiliser chez l'enfant ayant des antécédents de convulsion fébriles ou non.

Effet(s) indésirable(s) :

En raison de la présence de dérivés terpéniques (borneolum) et, en particulier, en cas d'administration supérieure aux doses préconisées ou de non-respect des conseils d'utilisation, agitation confusion peuvent survenir chez les sujets âgés, ainsi que des convulsions chez l'enfant.

Fabriqué par:

MA PAK LEUNG CO. Ltd.
306 queen's road,
HONG KONG